

Strepsils Junior, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Skład jakościowy i ilościowy: Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus) i 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna pastylka twarda zawiera 0,458 g maltitolu i 1,83 g izomaltu. Lek zawiera esencję truskawkową z glikolem propylenowym oraz alkoholem benzylowym. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz ChPL. Postać farmaceutyczna: Pastylka twarda. Różowe, okrągłe pastylki twarde, o smaku truskawkowym. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Dawkowanie i sposób podawania: Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów, nie dłużej niż 3 dni. Dorośli: Jedna pastylka co 2 - 3 godziny. Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 6 lat: dawkowanie jak u dorosłych. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Osoby w podeszłym wieku: Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u osób w podeszłym wieku. Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. Pastylkę należy ssać powoli. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u małych dzieci (ryzyko przypadkowego zakrztuszenia się). Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23kJ. Ze względu na zawartość maltitolu (E 965) i izomaltu, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ten lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu/izomaltu. Jedna pastylka twarda zawiera 0,458 g maltitolu i 1,83 g izomaltu. Ten lek zawiera 7,3 mg glikolu propylenowego na pastylkę twardą. Jest on obecny w esencji truskawkowej. Lek zawiera substancję zapachową (esencję truskawkową) z alkoholem benzylowym. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na pastylkę twardą to znaczy, że produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Wykaz poniższych zdarzeń niepożądanych zawiera te, które występowały podczas leczenia alkoholem 2,4-dichlorobenzylowym i amylometakrezolem w dawkach dostępnych bez recepty, przez krótki czas. Podczas leczenia chorób przewlekłych mogą wystąpić dodatkowe zdarzenia niepożądane. Zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i amylometakrezolu przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość ich występowania określono następująco: Bardzo często: $\geq 1/10$; Często: $\geq 1/100$, $< 1/100$; Rzadko: $\geq 1/1000$, $< 1/1000$; Bardzo rzadko: $< 1/10000$; Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane przedstawione są według malejącej ciężkości. Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości.¹ Zaburzenia żołądka i

jelit: Częstość nieznana: Ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej², bolesność języka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Częstość nieznana: Wysypka. Opis wybranych działań niepożądanych: 1 Reakcje nadwrażliwości mogą objawiać się wysypką, obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, skurczem oskrzeli i niedociśnieniem z omdleniem. 2 Dyskomfort w jamie ustnej może objawiać się podrażnieniem gardła, parestezją w jamie ustnej, obrzękiem jamy ustnej i glossodynią. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPL: 7785. OTC – Lek wydawany bez recepty