

PACJENT - PRZYGOTOWANIE DO SZCZEPIENIA

Dokumenty

☐ Weryfikacja ubezpieczenia pacjenta

- W przypadku refundowanej usługi szczepienia należy sprawdzić ubezpieczenie pacjenta w systemie eWUŚ

☐ Poinformowanie pacjenta o przebiegu szczepienia, możliwych działaniach niepożądanych i postępowaniu w razie ich wystąpienia

☐ Weryfikacja dokumentu tożsamości pacjenta

☐ Sprawdzenie historii szczepień pacjenta

- weryfikacja e-Karty Szczepień w systemie gabinet.gov
- potwierdzenie liczby dawek i odstępów czasowych.

Kwalifikacja do szczepienia (wywiad i ocena stanu zdrowia)

☐ Przekazanie i zebranie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza szczepienia

UWAGA Zawsze korzystaj z wiarygodnego kwestionariusza kwalifikacyjnego, aby unikać: podania szczepionki pacjentowi, u którego jest ona **przeciwwskazana** (sytuacja poważna, potencjalnie zagrażająca życiu), lub pominięcia możliwości szczepienia z powodu **falszywych przeciwwskazań** (co również może być niebezpieczne, ponieważ naraża pacjenta na choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia)

☐ Przeprowadzenie wywiadu medycznego

- Ocena przeciwwskazań i środków ostrożności
- Aktualny stan zdrowia pacjenta, choroby przewlekłe,
- Alergie (w tym na leki, białko jaja kurzego),
- Wcześniejsze reakcje poszczepienne,
- Przyjmowane leki (w tym immunosupresyjne),
- Ciążę lub jej podejrzenie (jeżeli dotyczy),
- Ostatnio wykonane szczepienia.

- ☐ W przypadku stwierdzenia wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepienia – odstąpienie od wykonania szczepienia oraz skierowanie pacjenta do lekarza w celu dalszej oceny.

Ocena stanu zdrowia pacjenta (w ramach kwalifikacji do szczepienia)

- ☐ Pomiar temperatury ciała pacjenta
- ☐ Ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta (samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy) - w przypadku gorączki lub złego stanu ogólnego zaleca się odroczenie szczepienia

Przygotowanie pacjenta do podania szczepionki

Farmaceuta dokonuje:

- ☐ Poinformowania pacjenta o przebiegu szczepienia
- ☐ Upewnienia się, że pacjent znajduje się w stabilnej i bezpiecznej pozycji, umożliwiającej prawidłowe wykonanie szczepienia oraz minimalizującej ryzyko urazu w przypadku nagłej reakcji po szczepieniu (np. omdlenia)
- ☐ Zapewnienia dostępu do miejsca wkłucia
- ☐ Poinformowania pacjenta o konieczności pozostania w aptece przez co najmniej 15 minut po szczepieniu